

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO

INDICAZIONI

Centro Prelievi di **Seriato**: Presentarsi al Centro Prelievi entro le ore 9:30

Centro Prelievi di **Trescore Balneario**: presentarsi alle ore 7:30.

Per tutti gli altri Centri Prelievo aziendali presentarsi nei normali orari di apertura

Rispettare un digiuno di almeno 8 ore (massimo 14) prima dell'esecuzione dell'esame.

L'esame prevede:

1. Esecuzione del prelievo basale e determinazione della glicemia con POCT per valutare l'idoneità al proseguimento dell'esame
2. Somministrazione per pazienti adulti di **75 g** di glucosio (**180 mL** di sciroppo). Gestanti: **100g** di glucosio (**240mL** di sciroppo). Pazienti in età pediatrica: **1,75 g** di glucosio **per Kg di peso ideale** secondo il seguente schema:

KG PESO CORPOREO	ML DI SCIROPPPO
10	42
20	84
30	126
40	168
43	180

diluito con 50-100 mL di acqua in una singola somministrazione; La soluzione di glucosio deve essere bevuta in circa 5 minuti.

3. prelievo ematico a 60 e 120 minuti dalla somministrazione del glucosio per le donne in gravidanza e a 120 minuti per adulti e bambini. La curva può essere prolungata fino a sei tempi e con tempistiche diverse a seconda dell'indicazione del medico prescrittore.

Durante tutta la durata del test rimanere seduto o sdraiato, senza fumare o mangiare. Non allontanarsi dal centro prelievi per tutta la durata dell'esame. In caso di vomito avvisare l'infermiera: l'esame verrà sospeso e si eseguirà solo la glicemia basale.